

Belangrijk

- Minimaal 2 uur vóór het onderzoek niet roken.
- Wanneer u toch de medicijnen ingenomen heeft, neem dan vóór het onderzoek contact op met de huisartsenpraktijk.
- Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, wees daarom op tijd.

Uitslag

De huisarts of de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige zal u terug bellen met de uitslag van uw longfunctieonderzoek.

Afspraak

Voor het longfunctieonderzoek wordt u verwacht op:

.....dag

....., om uur

Medicatie

- Voor het onderzoek mag u **wel** de longmedicatie/ allergiemedicatie gebruiken
- Voor het onderzoek mag u **niet** de longmedicatie/ allergiemedicatie gebruiken

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen van 9.00-11.00 en van 14.00-16.30 uur, via telefoonnummer: 020-6183878

Longfunctieonderzoek "spirometrie"



Een longfunctieonderzoek?

Als u regelmatig klachten heeft van benauwdheid, hoesten en/of kortademigheid, kan de huisarts u verwijzen voor een longfunctieonderzoek. Dan kan met behulp van een spirometrie worden vastgesteld wat er met uw luchtwegen aan de hand is. Het longfunctieonderzoek geeft de huisarts een duidelijk beeld van de conditie van uw luchtwegen, zodat de behandeling van de klachten zo goed mogelijk kan aansluiten.

Het onderzoek

Het longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige. Voor het onderzoek moet u een aantal keren diep in- en uitademen. U krijgt een buisje in uw mond; dat is aangesloten met de apparatuur. U mag alleen door de mond ademen, daarom krijgt u een klem op de neus. De praktijkondersteuner/ praktijkverpleegkundige zal u flink aanmoedigen om de beste resultaten te krijgen. Sommige oefeningen zult u een aantal keer moeten doen, waardoor u uiteindelijk wel vermoeid kan zijn. Het longfunctieonderzoek kan bestaan uit meerdere onderzoeken, maar het is niet altijd noodzakelijk dat die allemaal worden uitgevoerd. De huisarts bepaalt welke onderzoeken bij u worden gedaan.

Financieel

Dit onderzoek gaat niet ten koste van het eigen risico.

Vorbereiding

U hoeft voor het onderzoek geen speciale voorbereidingen te treffen. Het is echter in sommige gevallen nodig dat u uw longmedicatie of allergiemedicatie enige tijd stopt voor het onderzoek. Als dit nodig is zal dit worden aangegeven. Het is van groot belang dat u in ieder geval vanaf 2 uur vóór het onderzoek niet rookt.

Medicatie	Kleur	Stoppen vóór het onderzoek
Airomir	Grijs/blauw	6 uur
Atrovent	Grijs/ groen	
Berodual	(licht) blauw	
Salbutamol (ventolin)	Blauw/groen	12 uur
Atimos (formoterol)	Witte houder, blauwe dop	
Eklira	Wit/groen	
Foradil (formoterol)	Wit/ geel	
Flutiform/ fluticason/ formoterol	Grijs/grijs; grijs/rose; grijs/blauw	
Foster & Foster nexthaler	Rood/ rose	
Oxis	Wit met groene onderkant	
Seretide	Paars	
Serevent	Groen	
Symbicort	Wit met rode onderkant	
Onbrez (indacaterol)	Wit	24 uur
Spiriva	Groen	
Spiriva Respimat	Wit/grijs	
Seebri	Wit	
Ultibro	Wit/groen	

Alle bruine/ oranje medicatie mag u gebruiken!
Allergiemedicatie 3 dagen voor het onderzoek stoppen.